
Continuité et dérivation

6.1 Continuité d'une fonction

6.1.1 Définitions

Définition 1

Soit $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in D_f$. On suppose la fonction f définie au voisinage de a (et en a). On dit alors que f **est continue en a** si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Définition 2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de \mathbb{R} . On dit que f **est continue sur I** si la restriction f à I est continue en tout point de I . On note $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ (ou $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$) l'ensemble des fonctions continues sur I .

Proposition 3

Les fonctions usuelles (sauf la partie entière) sont toutes continues en tout point de leur ensemble de définition. C'est en particulier le cas pour :

- les fonctions polynomiales*
- les fonctions rationnelles (quotient de deux fonctions polynomiales)*
- la valeur absolue*
- la racine carrée*
- la fonction logarithme népérien*
- les fonctions exponentielles*
- les fonctions puissances*

Remarques :

- R1** – Si f et g sont deux fonctions continues sur I ,
 - la somme $f + g$ est encore une fonction continue sur I
 - le produit λf ($\lambda \in \mathbb{R}$) est encore une fonction continue sur I
 - le produit $f \times g$ est encore une fonction continue sur I
- R2** – Si f et g sont deux fonctions continues sur I et si g ne s'annule jamais sur I , alors la fonction $\frac{f}{g}$ est encore une fonction continue sur I .
- R3** – Si f est continue sur I et si g est continue sur J avec $f(I) \subset J$, alors la composée $g \circ f$ est continue sur I .

6.1.2 Théorème des Valeurs Intermédiaires**Théorème 4**

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Autrement dit, si f est continue sur un intervalle I , alors $f(I)$ est encore un intervalle.

Remarques :

- R1** – Les intervalles I et $f(I)$ peuvent être de natures différentes (ouvert, fermé, semi-ouvert, borné, non borné, ...)
- R2** – L'intervalle $f(I)$ peut être réduit à un singleton (la fonction f est alors constante).

Théorème 5***Théorème des valeurs intermédiaires***

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$ et $f(a) \neq f(b)$. Alors f prend toutes les valeurs "intermédiaires" comprises entre $f(a)$ et $f(b)$, i.e.

$$\forall y \in [f(a), f(b)] \text{ (ou } [f(b), f(a)]), \quad \exists x \in [a, b] / y = f(x)$$

Exemple :

Existence d'au moins une solution à l'équation $f(x) = 0$.

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

S'il existe deux éléments $a, b \in I$, $a < b$ tels que $f(a)f(b) \leq 0$ (i.e. $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés), alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a, b]$.

Remarque :

L'équation $f(x) = g(x)$ est équivalente à l'équation $h(x) = 0$ avec $h = f - g$. On peut alors appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur la fonction $f - g$.

Théorème 6

Si f est une fonction continue sur un segment $[a, b]$, alors f est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes.

Remarque :

Autrement dit, sur un segment $[a, b]$, une fonction f aura toujours un maximum et un minimum.

De plus, on aura $f([a, b]) = \left[\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x) \right]$.

Proposition 7

– Si f est une fonction croissante et continue sur $[a, b]$, alors

$$f([a, b]) = [f(a), f(b)]$$

– Si f est une fonction décroissante et continue sur $[a, b]$, alors

$$f([a, b]) = [f(b), f(a)]$$

Remarque :

Cela fonctionne encore pour des intervalles non fermés. Par exemple :

Si f est croissante et continue sur $[a, b[$, alors : $f([a, b]) = [f(a), \lim_b f[$.

Si f est décroissante et continue sur $]a, b]$, alors : $f([a, b]) = [f(b), \lim_a f[$.

6.1.3 Théorème de la bijection**Proposition 8**

Soit I un intervalle et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement monotone sur I .

Alors f est une fonction injective.

Démonstration :

Supposons par exemple que f soit strictement croissante sur I .

Soient $x, x' \in I$ tels que $f(x) = f(x')$.

Il nous faut montrer que $x = x'$.

Par l'absurde, si $x \neq x'$: il y a deux cas.

– si $x < x'$. Alors puisque f strictement croissante, $f(x) < f(x')$: impossible.

– si $x > x'$. Alors puisque f strictement croissante, $f(x) > f(x')$: impossible.

Ainsi, il n'est pas possible qu'on ait $x \neq x'$. Ainsi $x = x'$.

On a donc montré que $\forall x, x' \in I$, si $f(x) = f(x')$, alors $x = x'$.

Théorème 9*Théorème de la bijection*

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si

- f est continue sur I
- f est strictement monotone sur I

Alors, f réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $J = f(I)$.

De plus, sa bijection réciproque f^{-1} est également continue sur J et strictement monotone sur J , de même sens de variation que f .

Exemple :

Existence d'exactly une solution à l'équation $f(x) = 0$.

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

S'il existe deux éléments $a, b \in I$, $a < b$ tels que $f(a)f(b) \leq 0$ (i.e. $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés), alors l'équation $f(x) = 0$ admet une et une seule solution dans $[a, b]$.

Remarque :

Les courbes représentatives des fonctions f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

6.2 Dérivabilité en un point

6.2.1 Définitions

Définition 10

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in D$ tel que f soit définie au voisinage de a (et en a). On dit que f est **dérivable en a** si la quantité :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a$. Si c'est le cas, cette limite est appelé **nombre dérivé de f en a** , que l'on note $f'(a)$. On a donc

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Remarques :

R1 – On peut également dire que $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

R2 – La quantité $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ représente le coefficient directeur de la droite joignant les points de coordonnées $(x, f(x))$ et $(a, f(a))$. Si cette quantité admet une limite finie, cela correspond au coefficient directeur de la tangente.

Théorème 11

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in D$. Si la fonction f est dérivable en a , alors la courbe \mathcal{C}_f admet une tangente au point d'abscisse a , dont l'équation est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Démonstration :

Notons A le point de coordonnées $(a, f(a))$.

La tangente en A a nécessairement une équation du type : $y = \alpha x + \beta$.

avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Comme on l'a remarqué ci-dessus, le coefficient directeur de la tangente en A est $f'(a)$. On a donc $\alpha = f'(a)$. Ainsi l'équation de la tangente est : $y = f'(a)x + \beta$.

De plus, la droite doit passer par le point A . Donc l'équation doit être vérifiée pour $x = a$ et $y = f(a)$. Autrement dit : $f(a) = f'(a)a + \beta \iff \beta = f(a) - af'(a)$.

Ainsi l'équation de la droite est : $y = f'(a)x + f(a) - af'(a) = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Remarque :

Si la quantité $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ tend vers $\pm\infty$, la fonction f ne sera pas dérivable en a , mais la courbe admettra une (demi-)tangente verticale en a .

6.2.2 Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	Dérivabilité
1	0	\mathbb{R}
x	1	\mathbb{R}
x^2	$2x$	\mathbb{R}
x^3	$3x^2$	\mathbb{R}
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2} = (-1)x^{-2}$	\mathbb{R}^*
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$-\frac{2}{x^3} = (-2)x^{-3}$	\mathbb{R}^*

$f(x)$	$f'(x)$	Dérivabilité
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-1/2}$	$]0, +\infty[$
x^n ($n \in \mathbb{Z}$)	nx^{n-1}	\mathbb{R} si $n \geq 0$ \mathbb{R}^* si $n < 0$
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$\alpha x^{\alpha-1}$	$]0, +\infty[$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	\mathbb{R}

6.2.3 Propriétés

Théorème 12

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in D$.

Si la fonction f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Démonstration :

Supposons que la fonction f soit dérivable en a . On a donc : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$. Puisque $\lim_{x \rightarrow a} (x - a) = 0$, pour que la fraction admette une limite finie, il est nécessaire qu'on ait une f.l. " $\frac{0}{0}$ ", et donc nécessairement $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0$, autrement dit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Remarque :

La réciproque est fautive. Par exemple, la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

Définition 13

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in D$.

– On dit que f est **dérivable en a à droite**, si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

On note alors cette limite $f'_d(a)$.

– On dit que f est **dérivable en a à gauche**, si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

On note alors cette limite $f'_g(a)$.

Proposition 14

$$f \text{ dérivable en } a \in D \iff \begin{cases} f \text{ dérivable à droite en } a \\ f \text{ dérivable à gauche en } a \\ f'_d(a) = f'_g(a) \end{cases}$$

6.2.4 Sommes, produits, quotients**Théorème 15**

Soient f et g deux fonctions dérivables en a . Alors

1. $f + g$ est dérivable en a et

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$$

2. fg est dérivable en a et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

3. Si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$$

4. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, λf est dérivable en a et $(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$.

Démonstration :

Démonstration pour le produit. Pour tout $x \in D$ dans un voisinage de a :

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - fg(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x)(g(x) - g(a)) + g(a)f(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x)(g(x) - g(a)) + g(a)(f(x) - f(a))}{x - a} \\ &= f(x)\frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a)\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)g'(a) + f'(a)g(a) \end{aligned}$$

Démonstration pour le quotient. Puisque $g(a) \neq 0$ et que g est continue en a , on sait que sur tout un voisinage de a , les $g(x)$ sont non nuls. On a alors :

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} &= \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x - a} \\ &= \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{(x - a)g(x)g(a)} \\ &= \frac{(f(x) - f(a))g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(x)}{(x - a)g(x)g(a)} \\ &= \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}g(a) - f(a)\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}{g(x)g(a)} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2} \end{aligned}$$

6.2.5 Dérivée d'une composée

Théorème 16

Soit $u : I \rightarrow J$ dérivable en un point $a \in I$. Soit $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $b = u(a) \in J$. Alors la fonction $f \circ u$ est dérivable en a et $(f \circ u)'(a) = u'(a) \times f'(u(a))$.

Lorsqu'on a une expression qui est de la forme " $f(u(x))$ ", on utilise donc le tableau suivant des dérivées usuelles de composées :

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$u(x)$	$u'(x)$	$\sqrt{u(x)}$	$\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$
$u(x)^2$	$2u'(x)u(x)$	$u(x)^n \ (n \in \mathbb{Z})$	$nu'(x)u(x)^{n-1}$
$u(x)^3$	$3u'(x)u(x)^2$	$u(x)^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha u'(x)u(x)^{\alpha-1}$
$\frac{1}{u(x)}$	$-\frac{u'(x)}{u(x)^2}$	$\ln(u(x))$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$
$\frac{1}{u(x)^2}$	$-\frac{2u'(x)}{u(x)^3}$	$e^{u(x)}$	$u'(x)e^{u(x)}$

6.2.6 Dérivée d'une fonction réciproque

Théorème 17

Soit $f : I \rightarrow J = f(I)$ une fonction continue et strictement monotone sur I . On sait alors que f est une bijection de I sur un intervalle J . Soit $a \in I$ tel que f soit dérivable en a . Notons $b = f(a) \in J$ (et donc $a = f^{-1}(b)$). Alors

$$f^{-1} \text{ est dérivable en } b = f(a) \iff f'(a) \neq 0$$

Dans ce cas, on a :

$$(f^{-1})'(b) = (f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Remarque :

Graphiquement, une fonction est dérivable en un point si sa courbe représentative admet une tangente NON VERTICALE en ce point.

Puisque les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à l'axe $y = x$, la courbe de f^{-1} admet bien une tangente non verticale en un point si et seulement si la courbe de f n'admet pas de tangente horizontale au point symétrique. C'est pour cela qu'il faut que $f'(a) \neq 0$.

6.2.7 Dérivabilité et équivalent

Théorème 18

Soit f une fonction dérivable en a telle que $f'(a) \neq 0$. Alors : $f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f'(a)(x - a)$

Exemples :

E1 -

$$\exp(x) - \exp(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \exp'(0)(x - 0) \implies \boxed{e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x}$$

$$\ln(x) - \ln(0) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \ln'(1)(x - 1) \implies \boxed{\ln(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1}$$

En notant $\forall x > -1$, $f(x) = \ln(1 + x)$ et donc $f'(x) = \frac{1}{1 + x}$

$$f(x) - f(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} f'(0)(x - 0) \implies \boxed{\ln(1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x}$$

En notant $\forall x > -1$, $g(x) = (1 + x)^\alpha$ et donc $g'(x) = \alpha(1 + x)^{\alpha-1}$

$$g(x) - g(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} g'(0)(x - 0) \implies \boxed{(1 + x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x}$$

6.3 Dérivation sur un intervalle

6.3.1 Classe d'une fonction

Définition 19

Soit f une fonction définie sur son domaine de définition D_f . Si E désigne l'ensemble des points de D_f en lesquels f est dérivable, on définit alors une fonction sur E , notée f' , telle que $f' : \begin{matrix} E & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f'(x) \end{matrix}$. Cette fonction est appelée la **fonction dérivée de f** .

Définition 20

On appelle **dérivée n -ième de f** l'action de dérivée n fois la fonction f :

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad \forall n \geq 1, \quad f^{(n)} = (f^{(n-1)})' = (f')^{(n-1)}$$

Une fonction f est n -fois dérivable sur I si elle est $(n - 1)$ -fois dérivable sur I et si la fonction $f^{(n-1)}$ est dérivable sur I .

Remarques :

R1 - On note :

- $\mathcal{C}^0(I)$ l'ensemble des fonctions **continues sur I** .
- $\mathcal{C}^1(I)$ l'ensemble des fonctions **continûment dérivables sur I** , i.e. l'ensemble des fonctions qui sont dérivables sur I dont la fonction dérivée f' est continue sur I .
- $\mathcal{C}^n(I)$ l'ensemble des fonctions **n fois continûment dérivables sur I** , i.e. l'ensemble des fonctions n -fois dérivables sur I dont la fonction dérivée n -ième $f^{(n)}$ est continue sur I ;
- $\mathcal{C}^\infty(I)$ l'ensemble des **fonctions indéfiniment dérivables sur I**

R2 - On a les inclusions suivantes : $\mathcal{C}^\infty(I) \subset \dots \subset \mathcal{C}^{n+1}(I) \subset \mathcal{C}^n(I) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I) \subset \mathcal{C}^0(I) \subset \mathbb{R}^I$

6.3.2 Dérivées n -ièmes usuelles

Proposition 21

Dérivée n -ième d'une puissance

Notons $f : x \mapsto x^n$ où $n \in \mathbb{N}$. Alors la fonction f est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} et :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f^{(k)}(x) = \begin{cases} n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)x^{n-k} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Remarque :

Pour tout réel x , on a $f(x) = x^n$, $f'(x) = nx^{n-1}$, $f''(x) = n(n-1)x^{n-2}$, \dots , $f^{(n)}(x) = n!$ et $f^{(n+1)}(x) = 0$.

Proposition 22

Dérivée n -ième de la fonction inverse

Notons $f : x \mapsto \frac{1}{x}$. Alors la fonction f est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R}^* et :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}}$$

Démonstration :

Montrons-le par récurrence :

$$k = 0 : f \text{ est 0-fois dérivable sur } I \text{ et } \forall x \in I, f(x) = \frac{(-1)^0 0!}{x^{0+1}}.$$

Soit $k \geq 0$. On suppose la propriété vraie au rang k .

Posons $f^{(k)} : x \mapsto \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}}$ qui est dérivable sur I puisque $x \mapsto x^{k+1}$ l'est et n'est jamais nulle, donc f est bien $(k+1)$ -fois dérivable sur I et

$$\forall x \in I, f^{(k+1)}(x) = (-1)^k k! \times \frac{-(k+1)}{x^{k+2}} = \frac{(-1)^{k+1} (k+1)!}{x^{k+2}}$$

Proposition 23

Dérivée n -ième des fonctions \exp et \ln

La fonction exponentielle est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} , et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \exp^{(n)}(x) = \exp(x)$$

La fonction \ln est de classe \mathcal{C}^∞ sur $]0, +\infty[$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x > 0, \ln^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}$$

Démonstration :

C'est évident pour la fonction \exp .

De plus, on sait que $\forall x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc en notant $f : x \mapsto \frac{1}{x}$, on a :

$$\forall x > 0, \ln^{(n)}(x) = f^{(n-1)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}$$

6.3.3 Opérations sur les fonctions de classe \mathcal{C}^n

Proposition 24

Stabilité par combinaison linéaire

Si f et g sont deux fonctions de classe \mathcal{C}^n sur un intervalle I , alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $(\lambda f + g)$ est encore une fonction de classe \mathcal{C}^n et de plus :

$$(\alpha f + g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + g^{(n)}$$

Proposition 25

Formule de Leibniz

Soient f et g deux fonctions de classe \mathcal{C}^n sur un intervalle I , alors le produit (fg) est encore de classe \mathcal{C}^n et :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

Remarques :

R1 – On remarque l'analogie avec la formule du Binôme de Newton

R2 – De même, si f et g sont deux fonctions de classe \mathcal{C}^n sur un intervalle I et si g ne s'annule pas sur l'intervalle I , alors la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ est de classe \mathcal{C}^n sur l'intervalle I , mais on n'a pas a priori de formule pour calculer $\left(\frac{f}{g}\right)^{(n)}$.

Proposition 26

Soient I et J deux intervalles et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(I) \subset J$. Si f est de classe \mathcal{C}^n sur I , et si g est de classe \mathcal{C}^n sur J , alors $g \circ f$ est de classe \mathcal{C}^n .

Remarque :

On n'a a priori pas de formule pour calculer directement $(g \circ f)^{(n)}$.

Proposition 27

Soient I et J deux intervalles et soit f une fonction bijective de I dans J . Si f est de classe \mathcal{C}^n sur I , et si $\forall x \in I, f'(x) \neq 0$, alors la fonction réciproque f^{-1} est également de classe \mathcal{C}^n sur J .

Remarques :

R1 – Autrement dit, si f est bijective et de classe \mathcal{C}^n , il suffit que f^{-1} soit dérivable pour que f^{-1} soit finalement de classe \mathcal{C}^n .

Exemples :

E1 – Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $f_\alpha = x \mapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$ est de classe \mathcal{C}^∞ sur $]0, +\infty[$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x > 0, \alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - n + 1)x^{\alpha-n}$$

E2 – Pour $a > 0$, la fonction $f_a : x \mapsto a^x = e^{x \ln(a)}$ est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f_a^{(n)}(x) = (\ln(a))^n a^x$$

6.4 Théorèmes de dérivabilité

6.4.1 Théorème Limite de la Dérivée

Théorème 28

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ mais de classe \mathcal{C}^n a priori uniquement sur $[a, b[$.
Si la fonction $f^{(n)}$ admet une limite finie ℓ en b , alors f est de classe \mathcal{C}^n sur $[a, b]$ et $f^{(n)}(b) = \ell$.

Proposition 29

Soit I un intervalle et soit $a \in I$.
Soit f une fonction continue sur I (donc en a) et de classe \mathcal{C}^1 sur $I \setminus \{a\}$.
Si f' admet une limite finie en a , alors f est de classe \mathcal{C}^1 sur I et

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$$

Remarque :

Attention, la continuité en a est importante

6.4.2 Condition nécessaire d'extremum local

Définition 30

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $x_0 \in I$.
On dit que f admet un **maximum local en x_0** s'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \cap I, f(x) \leq f(x_0)$$

On dit que f admet un **minimum local en x_0** s'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \cap I, f(x) \geq f(x_0)$$

Un **extremum local** est un minimum ou maximum local.

Théorème 31

Condition nécessaire d'extremum local

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et soit x_0 un point intérieur de I (i.e. qui n'est pas sur les bords de l'intervalle).

$$\text{Si } f \text{ possède un extremum local en } x_0, \text{ alors } f'(x_0) = 0$$

autrement dit, il est nécessaire que $f'(x_0) = 0$ pour que f possède un extremum local en x_0 .

Remarque :

Si l'extremum est situé sur l'extrémité x_0 de l'intervalle I , rien n'impose alors que $f'(x_0) = 0$

6.4.3 Théorème de Rolle

Théorème 32

Théorème de Rolle

Soient a et b deux réels avec $a < b$.

Soit f une fonction de $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

- f continue sur $[a, b]$
- f dérivable sur $]a, b[$
- $f(a) = f(b)$

Alors il existe un $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Démonstration :

On sait que f est continue sur $[a, b]$, donc f bornée et atteint ses bornes.

Notons $M = \sup_{[a,b]} f = f(c)$ et $m = \inf_{[a,b]} f = f(d)$.

1er cas : $m = M$, alors $\forall x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M = m$, donc $f(x) = m$. Ainsi f est constante sur $[a, b]$, d'où $\forall c \in]a, b[, f'(c) = 0$.

2ème cas : $m < M$. On a alors $m < f(a)$ ou $f(a) < M$ (car sinon $m \geq f(a)$ et $f(a) \geq M$, on aurait $M \leq f(a) \leq m < M$: absurde).

Supposons par exemple que $m < f(a) = f(b)$, i.e. $f(d) < f(a) = f(b)$.

Donc d est un point intérieur de $[a, b]$, f est dérivable en d , f admet un extremum en d , donc on a $f'(d) = 0$.

6.4.4 Théorème des Accroissements Finis

Théorème 33

Théorème des Accroissements Finis

Soient a et b deux réels avec $a < b$.

Soit f une fonction de $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

- f continue sur $[a, b]$
- f dérivable sur $]a, b[$

Alors il existe un $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ou autrement dit, il existe un $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Démonstration :

Soit $\varphi : \begin{matrix} [a, b] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) - f(a) - K(x - a) \end{matrix}$ où K est une constante réelle choisie pour que $\varphi(b) = 0$.

K existe et est unique, puisque $K = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

On a :

- φ est continue sur $[a, b]$ car f l'est
- φ est dérivable sur $]a, b[$ car f l'est
- $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$

Donc (Théorème de Rolle), il existe $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, i.e. $f'(c) - K = 0$.

D'où $K = f'(c)$, i.e. $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

Conséquences 34*Inégalité des Accroissements Finis*

Soient a et b deux réels avec $a < b$.

Soit f une fonction de $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

- f continue sur $[a, b]$
- f dérivable sur $]a, b[$
- il existe deux réels m et M tels que $\forall x \in]a, b[, m \leq f'(x) \leq M$

Alors :

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$$

Conséquences 35*Inégalité des Accroissements Finis*

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et s'il existe $K > 0$ tel que

$$\forall t \in I, |f'(t)| \leq K$$

alors pour tous $x, y \in I$, on a :

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$$

6.4.5 Variations des fonctions**Théorème 36***Sens de variation d'une fonction*

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est constante sur $I \iff f' = 0$ sur I
- f est croissante sur $I \iff f' \geq 0$ sur I
- f est décroissante sur $I \iff f' \leq 0$ sur I

Démonstration :

Montrons l'équivalence pour f est croissante sur $I \iff f' \geq 0$ sur I

\Rightarrow Supposons que f est croissante sur I . Alors :

$$\forall x_0 \in I, \forall x \in I \setminus \{x_0\}, \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

Lorsque $x \rightarrow x_0$, f étant dérivable en x_0 on obtient en passant à la limite dans l'inégalité :

$$f'(x_0) \geq 0$$

\Leftarrow Soient $a \leq b$, deux réels de I . La fonction f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, donc

$$\exists c \in]a, b[/ f(b) - f(a) = (b - a)f'(c) \geq 0 \implies f(a) \leq f(b)$$

donc f est croissante sur I .

Remarque :

Soit f une fonction dérivable sur I .

- Si $f' > 0$ sur I sauf éventuellement en un nombre fini de points où elle s'annule, alors la fonction f est strictement croissante.
- Si $f' < 0$ sur I sauf éventuellement en un nombre fini de points où elle s'annule, alors la fonction f est strictement décroissante.

6.5 Convexité d'une fonction

Définition 37

Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^2 sur un intervalle I .

On dit que f est **convexe sur I** si une des propositions suivantes (équivalentes) est vérifiée :

- la courbe de f est au-dessus de toutes ses tangentes
- la fonction f' est croissante sur I
- la fonction f'' est positive sur I

Définition 38

Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^2 sur un intervalle I .

On dit que f est **concave sur I** si $-f$ est une fonction convexe sur I , autrement dit si une des propositions suivantes (équivalentes) est vérifiée :

- la courbe de f est en-dessous de toutes ses tangentes
- la fonction f' est décroissante sur I
- la fonction f'' est négative sur I

Remarque :

Si f est une fonction de classe \mathcal{C}^2 sur I , et si f'' s'annule en un point x_0 en changeant de signe, alors la fonction f change de convexité au point x_0 . Le point de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ est alors appelé un **point d'inflexion de la courbe \mathcal{C}_f** .

Un point d'inflexion est donc un point où la courbe \mathcal{C}_f traverse sa tangente.

Théorème 39

Inégalités de convexité

La fonction exponentielle est une fonction convexe sur \mathbb{R} et sa courbe est en particulier située au-dessus de sa tangente en 0 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$$

La fonction logarithme népérien est une fonction concave sur $]0, +\infty[$ et sa courbe est en particulier située en-dessous de sa tangente en 1 :

$$\forall x > 0, \ln(x) \leq x - 1$$

ou autrement dit

$$\forall x > -1, \ln(1 + x) \leq x$$