

En bleu, des éléments de réponses souvent oubliés dans vos copies.

**Exercice 1** Polynômes

1. La base canonique de  $\mathbb{R}_4[x]$  est  $(1, x, x^2, x^3, x^4)$ .
2. Soit  $f$  une fonction polynômiale appartenant à  $G$  alors il existe  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$  tel que pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = \lambda x^3 + \mu x^2 + \mu x + \lambda$ .  
En particulier  $f(-1) = -\lambda + \mu - \mu + \lambda = 0 \iff x + 1$  divise  $f$ .

**3. Etude de F et G**

- (a) On vérifie les trois caractéristiques d'un sev :  $F \subset \mathbb{R}_4[x]$ ;  $F \neq \emptyset$  car  $0 \in F$  et  $F$  est stable par combinaison linéaire (à faire vraiment!).

Idem pour  $G$ .

**OU plus rapidement :**

on écrit  $F$  et  $G$  comme des sous espaces vectoriels engendrés :

$$F = Vect(1 + x^4, x + x^3, x^2) \text{ et } G = Vect(1 + x^3, x + x^2) .$$

Les familles qui génèrent  $F$  et  $G$  sont échelonnées en degré donc libres. On a bien trouvé une base pour  $F$  et une base pour  $G$ .

- (b) Soit  $f \in F \cap G$  alors il existe  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$  tel que pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = \lambda x^3 + \mu x^2 + \mu x + \lambda$  et il existe  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  tel que  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a$ .  
Par identification des coefficients on a :  
 $\lambda = a = b$  (devant  $x^3$  et  $x^0$ ),  $\mu = b = c$  (devant  $x$  et  $x^2$ ) et  $a = 0$  (devant  $x^4$ ) donc  $f = 0$ .  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

- (c) D'après la question 3(a),  $dim(F) = 3$  et  $dim(G) = 2$ .

On a d'après la formule de Grassmann :

$$dim(F + G) = dim(F) + dim(G) - dim(F \cap G) = 3 + 2 - 0 = 5 = dim(\mathbb{R}_4[x]).$$

Or  $F + G \subset \mathbb{R}_4[x]$ , on a donc  $F + G = \mathbb{R}_4[x]$ .  $F$  et  $G$  sont bien supplémentaires dans  $\mathbb{R}_4[x]$ .

**4. Etude de H**

- (a)  $H$  est stable par combinaison linéaire car la dérivation et l'évaluation pour  $x = -1$  sont des applications linéaires : on se donne  $P$  et  $Q$  dans  $H$  et  $\lambda$  un réel alors  $(\lambda P + Q)'(-1) = \lambda P'(-1) + Q'(-1) = 0$  donc  $\lambda P + Q \in H$ .
- (b)  $H$  est un sev de  $\mathbb{R}_4[x]$  donc  $dim(H) \leq dim(\mathbb{R}_4[x]) = 5$ . Si  $dim(H) = 5$  alors  $H = \mathbb{R}_4[x]$  or il existe des vecteurs qui sont dans  $\mathbb{R}_4[x]$  et qui ne sont pas dans  $H$  par exemple la fonction polynômiale définie par  $f(x) = x$ . Ainsi on a bien  $dim(H) \leq 4$ .
- (c) Tous les vecteurs de la famille proposée sont dans  $H$  (à vérifier vraiment!). De plus la famille est échelonnée en degré, elle est libre et de cardinal maximal donc c'est bien une base de  $H$  et  $dim(H) = 4$ .

**5. Etude de  $G \cap H$**

- (a)  $G \cap H \subset G$  donc  $dim(G \cap H) \leq dim(G) = 2$ . Par ailleurs  $G \cap H \neq \{0\}$  car par exemple la fonction polynomiale définie par  $f(x) = (1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$  est dans  $G \cap H$  ainsi  $dim(G \cap H) \geq 1$ .  
Si  $dim(G \cap H) = 2 = dim(G)$  alors on aurait  $G \cap H = G$  soit  $G \subset H$  c'est absurde car  $x^3 + 1 \in G$  mais  $x^3 + 1 \notin H$  ainsi  $dim(G \cap H) = 1$ .
- (b) Evident d'après la question 2 et la définition de  $H$  : si  $f \in G \cap H$  alors 1 est racine de  $f$  et de  $f'$  donc 1 est racine d'ordre au moins 2 de  $f$ .
- (c) Il suffit de considérer un vecteur commun à  $G$  et à  $H$  par exemple  $(1+x)^3$ , on a nécessairement  $G \cap H = Vect((1+x)^3)$ .

## Exercice 2 Matrices

### Partie A

1.  $E$  est un sous ensemble de  $M_3(\mathbb{R})$  et il est non vide car il contient la matrice  $A$  par exemple. Si on se donne 2 matrices de  $E$  cela revient à se donner 4 réels  $a, b, a', b'$ . Soit également  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Montrons que  $aA + bB + \lambda(a'A + b'B) \in E$ . On a :

$aA + bB + \lambda(a'A + b'B) = (a + \lambda a')A + (b + \lambda b')B \in E$  donc  $E$  est stable par combinaison linéaire. C'est bien un sev de  $M_3(\mathbb{R})$ .

**OU plus rapidement :**  $E = Vect(A; B)$  donc  $E$  est le sous espace vectoriel de  $M_3(\mathbb{R})$  engendré par les matrices  $A$  et  $B$  qui ne sont pas proportionnelles donc  $dim(E) = 2$ .

2. (a)  $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 2A \in E$ .  $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = A - B \in E$ .

$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} = 2B \in E$ .  $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} = 2B \in E$ .

- (b)  $E = Vect(A, B)$  contient  $A^2, B^2, AB$  et  $BA$  donc  $E$  est stable par produit. On peut aussi le vérifier en se donnant  $a, b, a', b'$  4 réels et en calculant :

$$(aA + bB)(a'A + b'B) = aa'A^2 + ab'AB + ba'BA + bb'B^2$$
$$= aa'(2A) + ab'2B + a'b2B + bb'(A - B) = (2aa' + bb')A + (2ab' + 2a'b - bb')B \in E$$

3. (a) On a facilement, en résolvant un système  $2 \times 2$  que

$$A = \frac{1}{3}(2C + D) \text{ et } B = \frac{1}{3}(C - D)$$

- (b)  $A$  et  $B$  commutent d'après la question 2)a), on peut donc appliquer les identités remarquables et on a :  $C^2 = A^2 + 2AB + B^2 = 2A + 4B + A - B = 3A + 3B = 3C$  ;  
 $D^2 = A^2 - 4AB + 4B^2 = 2A - 8B + 4(A - B) = 6A - 12B = 6D$  ;  
 $CD = DC = A^2 - AB - 2B^2 = 0$ .

- (c) Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  alors d'après la question 3a) on a :

$$aA + bB = a\frac{1}{3}(2C + D) + b\frac{1}{3}(C - D) = \frac{1}{3}((2a + b)C + (a - b)D)$$

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}^*. \text{ On a } (aA + bB)^n = \frac{1}{3^n}((2a + b)C + (a - b)D)^n.$$

Avec le binôme de Newton, puisque  $C$  et  $D$  commutent on a :  $(aA + bB)^n$

$$= \frac{1}{3^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - b)^k (2a + b)^{n-k} D^k C^{n-k} = \frac{1}{3^n} ((2a + b)^n C^n + (a - b)^n D^n)$$

$$= \frac{1}{3^n} ((2a + b)^n 3^{n-1} C + (a - b)^n 6^{n-1} D) = \frac{1}{3} ((2a + b)^n C + (a - b)^n 2^{n-1} D) .$$

### Partie B

1. Soit  $(x, y, z) \in Ker(f)$ .

$$\text{Alors } x - y = 0; -x + y = 0; 2z = 0 \iff x = y; z = 0 \iff (x; y; z) \in Vect(u).$$

2.  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires donc il forment une famille libre.

De plus,  $w \notin Vect(u, v)$  car l'abscisse de  $w$  n'est pas égale à son ordonnée. On a donc une famille  $(u, v, w)$  qui est libre et de cardinal 3. Comme  $3 = dim(\mathbb{R}^3)$ , c'est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

3. Avec un produit matriciel on a  $f(v) = 2v$  et  $f(w) = 2w$

4. La matrice de  $f$  dans la base  $(u, v, w)$  est donc  $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

5. (a) Les vecteurs colonnes de  $P$  forment une famille libre de  $\mathbb{R}^3$  donc  $P$  est inversible. Avec la méthode de Gauss Jordan ou en résolvant un système on trouve

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 & 0 \\ -0,25 & 0,25 & 1 \\ 0,25 & -0,25 & 0 \end{pmatrix}$$

- (b) On priorise le produit matriciel.
- (c) En remarquant que  $A = PDP^{-1}$ , une récurrence immédiate permet de retrouver que pour tout entier naturel  $A^n = PD^nP^{-1}$

**Exercice 3** Suite implicite (ENS 2019, à l'oral)


1. La fonction  $f_n : [0; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable en tant que polynôme et pour tout réel  $x \geq 0$ ,  $f'_n(x) = nx^{n-1} + 1 > 0$ . Ainsi la fonction  $f_n$  est continue et **strictement** croissante sur  $[0; +\infty[$ . Par ailleurs  $0 \in [f_n(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)[$  ainsi le théorème de la bijection assure que l'équation  $f_n(x) = 0$  admet une unique solution  $x_n$  dans  $[0; +\infty[$ . De plus  $f_n(1) = 1$  donc  $x_n < 1$  et  $f_n(0) = -1$  donc  $x_n > 0$ .
2. (a)  $f_{n+1}(x_n) = (x_n)^{n+1} + x_n - 1 = (x_n)^n x_n + x_n - 1 = (1 - x_n)x_n + x_n - 1 = (1 - x_n)(x_n - 1) < 0$  d'après la question 1.
- (b)  $f_{n+1}(x_n) < 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$  or la fonction  $f_{n+1}$  est strictement croissante donc elle conserve l'ordre ainsi  $x_n < x_{n+1}$ . La suite  $(x_n)$  est croissante.
- (c) La suite est majorée par 1 d'après la question 1.
- (d) Le théorème de la limite monotone assure que la suite est convergente. **Sa limite  $l$  est nécessairement positive et plus petite que 1.**  
 Supposons par l'absurde que  $l < 1$ . On sait que pour tout  $n \geq 2$ ,  $x_n^n \leq l^n$ .  
 Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} l^n = 0$ .  
 Or par définition  $x_n^n = 1 - x_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - x_n = 1 - l > 0$  ce qui est en contradiction avec  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^n = 0$ . Ainsi  $l = 1$ .

## Problème

### Partie I

- a )  $f$  est continue sur  $] - \infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$  en tant que quotient de fonctions continues, le dénominateur ne s'annulant pas. Il reste à vérifier la continuité en 0. Or on sait avec un équivalent usuel que :  $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$ . Puisque  $1 = f(0)$ , la fonction est continue sur  $\mathbb{R}$ .
- b )  $f$  est  $C^1$  (et même  $C^\infty$ ) sur  $] - \infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$  en tant que quotient de fonctions  $C^1$ , le dénominateur ne s'annulant pas et pour tout réel  $x$  non nul on a :  $f'(x) = \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{(1-x)e^x - 1}{(e^x - 1)^2}$ .
- c ) La fonction  $u$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  en tant que somme et produit de fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$  on a :  $u'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$ . Comme  $e^x > 0$ ,  $u'(x)$  est du signe de  $-x$  donc la fonction  $u$  est croissante sur  $] - \infty; 0[$  et décroissante sur  $]0; +\infty[$ .
- d ) Par opérations sur les limites, on a :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  et par croissances comparées,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ .
- e ) On remarque que le maximum de la fonction  $u$  est 0 ainsi pour tout réel  $x$  non nul,  $u(x) \leq 0$ . La fonction  $f'$  est donc négative sur  $] - \infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$  d'où le tableau de variations suivant :

$x$	$-\infty$		$0$		$+\infty$
$f'(x)$		-			
$f$	$+\infty$	1			$0$



f )

### Partie II

- On cherche s'il existe  $\alpha \in \mathbb{R}^*$  tel que  $f(x) = x \iff \frac{x}{e^x - 1} = x \iff x = x(e^x - 1) \iff x(2 - e^x) = 0 \iff e^x = 2 \iff x = \ln(2)$ . Par ailleurs 0 n'est pas un point fixe de  $f$  donc  $f$  admet bien pour unique point fixe  $\alpha = \ln(2)$ .
- (a) Soit  $x > 0$ ;  $f'(x) + \frac{1}{2} = \frac{(1-x)e^x - 1 + \frac{1}{2}e^{2x} - e^x + \frac{1}{2}}{(e^x - 1)^2} = \frac{e^{2x} - 2xe^x - 1}{2(e^x - 1)^2}$ . Il s'agit de justifier que pour tout réel  $x > 0$ ,  $e^{2x} - 2xe^x - 1 \geq 0$ . Etudions la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $g(x) = e^{2x} - 2xe^x - 1$ .  $g$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  et pour tout réel  $x$  strictement positif on a :  $g'(x) = 2e^{2x} - 2e^x - 2xe^x = 2e^x(e^x - 1 - x)$ . On a besoin d'étudier le signe de  $e^x - 1 - x$ . On sait par convexité que  $e^x \geq 1 + x$ . Ainsi par produit,  $g'(x) \geq 0$  et  $g$  est croissante sur  $]0; +\infty[$ . Or  $g(0) = 0$  donc pour tout réel  $x > 0$ ,  $g(x) \geq 0$  puis  $f'(x) + \frac{1}{2} \geq 0$  en tant que quotient de 2 expressions positives.

- (b) **On raisonne par disjonction de cas** : si  $x \neq 0$  alors d'après II 2(a) et I e on a  $-\frac{1}{2} \leq f'(x) < 0$ . Comme on admet que  $f'(0) = \frac{-1}{2}$ , l'inégalité précédente devient vraie pour tout réel  $x$ .
- (c) **L'étude de  $f$  nous assure que la suite  $(u_n)$  est bien définie parce que l'intervalle  $I = [0; +\infty[$  est stable par  $f$ .**  
 On applique l'inégalité des accroissements finis à  $f$  (2ème forme) :  
 on sait que  **$f$  est dérivable sur l'intervalle  $I = [0; +\infty[$** , et  $\forall x \in I, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ .  
 Soit  $n \in \mathbb{N}$  alors :  $|f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$  or  $f(\alpha) = \alpha$  et  $f(u_n) = u_{n+1}$ .  
 CQFD
- (d) — I :  $u_0 = 1$  et  $(\frac{1}{2})^0 = 1$  donc l'inégalité est vraie pour  $n = 0$  (c'est même une égalité).  
 — H : Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $|u_n - \alpha| \leq (\frac{1}{2})^n |1 - \alpha|$ . Le résultat établi à la question précédente assure que  $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^n |1 - \alpha|$  par hypothèse de récurrence.  
 On a bien :  $|u_{n+1} - \alpha| \leq (\frac{1}{2})^{n+1} |1 - \alpha|$ .  
 — C : La propriété est vraie pour  $n = 0$  et elle est héréditaire donc elle est vraie pour tous les entiers  $n$ .
- (e) **Par encadrement**, on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$ .

### Partie III

- Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Une disjonction de cas suivant le signe de  $x$  montre qu'on a :  
 $G(x) = F(2x) - F(x)$  (0 si  $x = 0$ )
- $f$  étant continue sur  $\mathbb{R}$ ,  $F$  est  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  car pour tout réel  $x$ ,  $F'(x) = f(x)$ . Ainsi **par composition**  $G$  est  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$ , on a :  
 $G'(x) = 2F'(2x) - F'(x) = 2f(2x) - f(x)$ .  
 Si  $x \neq 0$ , alors  $G'(x) = \frac{4x}{e^{2x}-1} - \frac{x}{e^x-1} = \frac{4x-x(e^x+1)}{e^{2x}-1} = \frac{x(3-e^x)}{e^{2x}-1}$   
 Si  $x = 0$  alors  $G'(0) = 2 - 1 = 1$ .
- (a) Soit  $x \geq 0$ . La fonction  $f$  étant décroissante sur  $\mathbb{R}^+$ , pour tout réel  $t \in [x; 2x]$  on a :  $0 < f(0) \leq f(t) \leq f(x)$ . En intégrant entre  $x$  et  $2x$ , les bornes étant dans le bon ordre, on a par positivité de l'intégrale :  $xf(0) \leq G(x) \leq xf(x)$   
 d'où  $0 \leq G(x) \leq xf(x)$   
 (b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$  **par croissances comparées**.  
 Le théorème d'encadrement assure donc que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 0$
- Soit  $x \leq 0$ . La fonction  $f$  étant décroissante sur  $\mathbb{R}^-$ , pour tout réel  $t \in [2x; x]$  on a :  $0 < f(x) \leq f(t) \leq f(0)$ . En intégrant entre  $x$  et  $2x$ , les bornes étant dans le mauvais ordre, on a par positivité de l'intégrale :  
 $xf(0) \leq G(x) \leq xf(x)$  d'où  $x \leq G(x) \leq xf(x)$   
 On sait que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} xf(x) = -\infty$  par opérations.  
 Le théorème de comparaison assure donc que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = -\infty$

5. Grâce aux réponses des questions 2, 3 et 4, on a les tableaux suivants :

$x$	$-\infty$	$0$	$\ln(3)$	$+\infty$
$x$	-	0	+	+
$3 - e^x$	+	0	+	-
$e^{2x} - 1$	-	0	+	+
$G'$	+	1	+	-
$G$	$-\infty$	$0$	$G(\ln(3))$	$0$

### ERREURS A NE PLUS REPRODUIRE

- Faire une mauvaise manipulation de la valeur absolue
- Confondre cardinal, degré, dimension
- Ecrire "supposons l'hypothèse"...
- Dans un ensemble, le premier élément donne la nature de l'objet, le suivant donne une caractérisation de cet objet
- Ne pas expliquer sa démarche
- Répondre à la moitié de la question (vous passez à côté de la moitié des points!)
- Appliquer un résultat du cours sans vérifier les conditions de son application
- Confondre une suite implicite, une suite récurrente, une suite explicite
- Ne pas traiter les questions faciles (récurrence, théorème de la bijection, résolution d'équation ou de système...)